


# Diagnóstico diferencial **DIARREA CRÓNICA**



1. Historia clínica, incluir consumo, tipo de alimento y contacto con perros afectados // 2. Exploración Clínica con palpación abdominal y examen rectal // 3. Datos mínimos: hematoología, bioquímica, urinalisis // 4. Si hipoalbuminemia, descartar disfunción hepática con ácidos biliares, proteinuria y UPC ratio // 5. Ecografía muestra engrosamiento difuso y pérdida de pared // 6. Si no hay respuesta a los antibióticos o la dieta de exclusión se recomienda biopsia intestinal, sino probar tratamiento empírico de IBD // 7. ARD, Enteropatía que responde a antibióticos: diagnóstico basado en respuesta a los antibióticos (conocida como SIBO, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado) // 8. Alergia Alimentaria; diagnóstico basado en la respuesta empírica a una dieta de exclusión // 9. Evaluar si reaparecen los síntomas con diferentes alimentos, hasta identificar el problema y elegir dieta de mantenimiento // 10. Signos de colitis: alta frecuencia de defecación con poca cantidad de heces, presencia de moco o sangre, tenesmo y no pérdida de peso // 11. Algunos perros con IBD (enfermedad inflamatoria intestinal) responden a dieta hipoalérgica y/o Gastroenterica sin inmunosupresión // \* Gastro Enteric Diet, puede probarse conjuntamente con antibióticos, aunque algunos perros respondería al antibiótico sólo // IBD=Enfermedad intestinal inflamatoria // ARD=Diarrea que responde al antibiótico